



GUÍA VISUAL DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES INCLUIDAS

en el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

NOMBRE COMÚN: **NOMBRE COMÚN**
NOMBRE CIENTÍFICO: **Nombre Científico** autor año

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN VISUAL

INTERPRETACIÓN DE SÍMBOLOS

Todos los contenidos de esta Guía de Identificación (Incluyendo, pero no limitado a texto y fotografías) están sujetos a derechos de propiedad por la Normativa de Derechos de Autor y demás Normativa Internacional, siendo los titulares la Fundación Neotrópico y terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión. En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de Fundación Neotrópico.



ESPECIE INCLUIDA en el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.



ESPECIE NO INCLUIDA en el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.



ESPECIE INCLUIDA en el DECRETO 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias.



ESPECIE NO INCLUIDA en el DECRETO 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias.



ESPECIE INCLUIDA en el Convenio sobre Comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). Se indica el nº del Apéndice correspondiente. Incluida además en el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (y posteriores modificaciones). Se indica la letra del Anexo correspondiente.



ESPECIE NO INCLUIDA en el Convenio sobre Comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). No Incluida tampoco en el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (ni posteriores modificaciones).



Este símbolo indica que la imagen adyacente se usa bajo licencia Creative Commons, reseñándose el autor.

ÍNDICE

Anolis spp.
Chamaeleo calyptratus
Chamaeleo dilepis
Chlamydosaurus kingii
Coleonyx mitratus
Cyclura cornuta
Gekko gekko
Iguana iguana
Intellagama lesueurii
Phelsuma madagascariensis
Physignathus cocincinus
Pseudemys peninsularis.
Python regius.
Rieppeleon brevicaudatus
Salvator rufescens
Sceloporus jarrovii
Sceloporus malachiticus
Tiliqua gigas
Varanus exanthematicus.
Zonosaurus laticaudatus

Dendrocygna bicolor
Gracula religiosa
Psittacula eupatria

Acomys cahirinus
Cricetomys gambianus
Cynictis penicillata
Echinops telfairi
Erinaceus europaeus
Mephitis mephitis
Petaurus breviceps
Suricata suricatta
Sus scrofa var. domestica raza VIETNAMITA.
Vulpes zerda



NOMBRE COMÚN: **ANOLIS, LAGARTO CAMALEÓN**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Anolis sp.*** Daudin, 1802



Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Russ



Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Ianaré Sévi



Abanico gular bien desarrollado en machos.
Algunas especies en CITES otras no.

NOMBRE COMÚN: **CAMALEÓN DE VELA , DE CASCO, O DE YEMEN**
NOMBRE CIENTÍFICO: ***Chamaeleo calyptratus*** Duméril y Duméril, 1851



MACHO

Foto: Fundación Neotrópico



MACHO

Foto: Fundación Neotrópico



HEMBRA

Foto: Fundación Neotrópico

Casco cefálico muy protuberante en machos adultos, menos marcado en las hembras



NOMBRE COMÚN: **CAMALEÓN OREJERO**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Chamaeleo dilepis* Leach 1819




 Foto: HuBoro



 Foto: Bernard Dupont



 Foto: Harvey Barrison

En los adultos hay solapa de piel en la zona nuchal que da nombre común a la especie. Coloración variable



NOMBRE COMÚN: **LAGARTO DE GORGUERA O CLAMIDOSAURIO DE KING**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Chlamydosaurus kingii* Gray, 1825



* Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Matt Clancy

Abanico de piel que rodea desde la nuca a la garganta a modo de babero. Con el animal en reposo permanece replegado.



NOMBRE COMÚN: **GECO LISTADO DE AMÉRICA CENTRAL**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Coleonyx mitratus* (Peters, 1863)




Foto: Kevin Venegas Barrantes



Foto: Kevin Venegas Barrantes



Foto: Kevin Venegas Barrantes



Eublepharis macularius

Foto: Fundación Neotrópico

A diferencia de los *Eublepharis macularius*, la grasa se acumula en todo el cuerpo y no sólo en la cola. Los machos presentan espuelas en los laterales de la base de la cola.



NOMBRE COMÚN: **IGUANA RINOCERONTE**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Cyclura cornuta*** (Bonnaterre, 1789)



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Fundación Neotrópico

Ausencia de escamas gulares grandes, sin abanico gular.
Color marrón uniforme.
Cuernos, y casco más marcados en los machos.



NOMBRE COMÚN: **GECO TOKAY**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Gekko gecko* (Linnaeus, 1758)



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Robert Michniewicz

Perenquén gigante, generalmente con librea azul claro y lunares que varían en la gama de colores entre el naranja y el rojo. Cambian de tonalidad en función de la temperatura y su estado de ánimo.



NOMBRE COMÚN: **IGUANA VERDE O COMÚN**
NOMBRE CIENTÍFICO: ***Iguana iguana*** (Linnaeus, 1758)




Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico

Cresta dorsal desde la nuca hasta la cola, más marcada en adultos y especialmente en machos. Color general muy variable. Abanico gular también mayor en machos. En ocasiones 1 o 2 escamas en forma cuernos sobre la nariz. Al menos 1 escama muy grande en la garganta. Cola muy larga con franjas claras y oscuras alternadas.



NOMBRE COMÚN: **DRAGÓN DE AGUA AUSTRALIANO**
NOMBRE CIENTÍFICO: *Intellagama lesueurii* (Gray, 1831)



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Dragón de agua chino,
Physignathus cocincinus



Dragón de agua australiano

Foto: Fundación Neotrópico

Franja postocular oscura. Piel más áspera que el dragón de agua chino.
Cresta nuchal marcada y dorsal muy reducida.
Color grisáceo, con franjas dorsales más oscuras.



NOMBRE COMÚN: **GECO DIURNO DE MADAGASCAR**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831



II
B




Phelsuma grandis

Foto: Fundación Neotrópico



Phelsuma madagascariensis



Phelsuma madagascariensis



Phelsuma grandis

Foto: / Foto retoque Fundación Neotrópico



Foto: Mags49

Franja roja desde la nariz hasta el cuello, en *Phelsuma grandis* franja sólo hasta el ojo.
Escamas globulares en los flancos mucho mayores que en el dorso.
En *P. grandis* sólo algo mayores que en el dorso, que además presenta color verde más intenso.



NOMBRE COMÚN: **DRAGÓN DE AGUA CHINO**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Physignathus cocincinus* Cuvier, 1829



MACHO

Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



HEMBRA

Foto: Fundación Neotrópico



JUVENIL

Foto: Fundación Neotrópico

Cresta dorsal desde la nuca hasta la cola. Franja horizontal oscura a través del ojo desde el orificio nasal hasta la nuca. Sin abanico gular, ni escama grande singular en la garganta. Escamas espinosas en el borde trasero de la mandíbula. Franjas oscuras y claras en la cola. Color general verde brillante cuando la temperatura es apropiada.





NOMBRE COMÚN: **GALÁPAGO O TORTUGA DE LA PENÍNSULA**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Pseudemys peninsularis* Carr, 1938



Foto: Fundación Neotrópico




Pseudemys ruvibentris

Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico




Pseudemys nelsoni

Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico

Foto: Fundación Neotrópico



Pseudemys concinna

Foto: Fundación Neotrópico

Plastrón prácticamente sin manchas y de color amarillo pálido.
Sin franja (detrás del ojo) horizontal naranja/roja ni vertical amarilla.
Sin manchas marrones en el caparazón: sólo tonos de verde y amarillo.



NOMBRE COMÚN: **PITÓN REAL O DE BOLA**
NOMBRE CIENTÍFICO: *Python regius* (Shaw, 1802)



Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Fundación Neotrópico



XYZreptiles.com

Algunas de las más de 6.000
fases de color artificiales

Franja clara desde encima de la nariz hasta la nuca.
Parte superior de la cabeza marrón (excepto fases artificiales).
10 foquetas termosensibles en labio superior. Ausentes en el inferior




Foto: XYZ Reptiles.com



NOMBRE COMÚN: **CAMALEÓN DE COLA CORTA BARBUDO, HOJA O PIGMEO**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Rieppeleon brevicaudatus*** (Matschie, 1892)



Foto: R. J. Blach



Foto: R. J. Blach

Muy pequeño (hasta 8 cm), con cola muy corta.
Escamas resaltadas en la zona de la barbilla.
Cresta dorsal poco pronunciada.



NOMBRE COMÚN: **TEJÚ ROJO**

NOMBRE CIENTÍFICO: **Salvator rufescens (GÜNTHER, 1871)**



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico

Adultos de color claro y oscuro rojizo, especialmente los machos que además alcanzan hasta los 140 cm de longitud total. Cabeza y cuerpo robustos con franjas dorsales oscuras.



NOMBRE COMÚN: **LAGARTO ESPINOSO DE YARROW**
NOMBRE CIENTÍFICO: *Sceloporus jarrovi* Cope, 1875



Foto: Alan Schmierer




Foto: Alan Schmierer

Escamas carenadas y elevadas que dan aspecto espinoso.
Anillo oscuro alrededor del cuello. Hembras parduzcas.
Cola, garganta y vientre con manchas azules de distinta intensidad.




NOMBRE COMÚN: **LAGARTO ESPINOSO ESMERALDA**
NOMBRE CIENTÍFICO: *Sceloporus malachiticus* Cope, 1864



MACHO



Foto: Charlie Jackson



HEMBRA




Foto: Charlie Jackson

Escamas carenadas y elevadas que dan aspecto espinoso.
Hembras parduzcas. Machos con dorso de color verde y cola azulada.
Garganta y vientre con manchas azules de distinta intensidad.



NOMBRE COMÚN: **ESLIZÓN DE LENGUA AZUL GIGANTE**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Tiliqua gigas* (Schneider, 1801)



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico

Tiliqua scincoides. Eslizón de lengua azul común



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Stephan3345

A: *Tiliqua gigas*. Escamas con bordes multicarenados.
Manchas negras abundantes.

B: *Tiliqua scincoides*. Escamas más lisas. Manchas marrones. Color Negro escaso.



NOMBRE COMÚN: **VARANO DE LA SABANA**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Varanus exanthematicus* (BOSC, 1792)



II
B



Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Fundación Neotrópico

Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico

Escamas redondeadas. Patas cortas y fuertes, con uñas largas. Dorso gris con lunares claros. Orificio nasal equidistante con la punta del hocido. Alrededor de 1 m de longitud total. En *Varanus albigularis* el orificio nasal está más cerca del ojo que de la punta del hocido y presenta franjas dorsales oscuras más marcadas y detrás del ojo más larga y oscura.



NOMBRE COMÚN: **LAGARTO LISTADO OCCIDENTAL DE MADAGASCAR**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Zonosaurus laticaudatus* (Grandidier, 1869)



Foto: Heinonlein




Foto: Heinonlein



Foto: Vincent Malloy



1 Pliegue de piel en los flancos que va desde el oído hasta las patas traseras.
2 rayas dorsales claras y anchas desde la base de la cabeza y estrechándose hacia la cola.
En *Z. madagascariensis* las rayas empiezan en la cabeza, no en la base. Cabeza marrón-rojiza.

NOMBRE COMÚN: **SURIRÍ BICOLOR O PATO SILBÓN COMÚN**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Dendrocyna bicolor* (Vieillot, 1816)



Foto: Marie-Lan Taï Pamart



Fotos: Richard Crossley



Foto: Else2



Tadorna ferruginea



Foto: Mprasannak

Franja vertical opaca en la parte posterior del cuello.
Patatas relativamente largas para ser un pato.



NOMBRE COMÚN: **MINÁ SAGRADO O DEL HIMALAYA**
 NOMBRE CIENTÍFICO: *Gracula religiosa* Linnaeus, 1758



Foto: Evanahmed75




Foto: Spencer Wright



Corvus corax canariensis

Foto: Fundación Neotrópico



Turdus merula cabreræ

Foto: Fundación Neotrópico



Acridotheres tristis

Foto: Fundación Neotrópico

Plumaje negro brillante. Patas amarillas.
 Carúncula amarilla desarrollada especialmente bajo el ojo y la nuca.
 Pico naranja.



NOMBRE COMÚN: **COTORRA ALEJANDRINA**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Psittacula eupatria* (Linnaeus, 1766)



Foto: Fundación Neotrópico




Foto: Fundación Neotrópico



Psittacula derbiana

Foto: Fundación Neotrópico



Psittacula krameri

Foto: Fundación Neotrópico

Parte inferior del pico roja, igual que la superior.
En *Psittacula krameri* la parte inferior del pico es *mas oscura*.
Franja vertical rojiza en el hombro.



NOMBRE COMÚN: **RATÓN ESPINOSO EGIPCIO**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Acomys cahirinus*** (É. Geoffroy, 1803)



Foto: Olei



Foto: Andy Mabbet



Foto: Olei

Cerdas defensivas, espinosas, oscuras y eréctiles en el lomo.
Cola larga, desnuda y fracturable.



NOMBRE COMÚN: **RATA DE GAMBIA**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Cricetomys gambianus*** Waterhouse, 1840



Foto: Rosarinagazo



Cricetomys emini




Foto: Goooutside



Cricetomys gambianus



Foto: Louisvarley



Foto: FWS




Foto: Laëtitia Dudous



Muy grande. Pelaje marrón oscuro y grueso. Anillo oscuro alrededor de los ojos.
Último tercio de la cola blanco. Bigotes muy largos oscuros. Abdomen
diferencialmente más claro que el dorso. En *Cricetomys emini* es menos contrastado.

NOMBRE COMÚN: **MANGOSTA AMARILLA, O DE COLA GRUESA**
NOMBRE CIENTÍFICO: ***Cynictis penicillata*** (G. (Baron) Cuvier, 1829)




Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Sin rayas en la cola ni en el dorso.
Color uniforme marrón o dorado.

NOMBRE COMÚN: **TENREC ERIZO MENOR DE MADAGASCAR, O CHICO**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Echinops telfairi* Martin, 1838




Foto: Bernard Dupont



Foto: Wilfried Berns



Erizo moruno: *Atelerix algirus*

Foto: Fundación Neotrópico

Ojos más pequeños y orejas mayores que las de los erizos.
Piel de la cara rosácea. Sin genitales externos. Más estilizado y púas más cortas que en los erizos europeo o moruno.



NOMBRE COMÚN: **ERIZO EUROPEO**

NOMBRE CIENTÍFICO: *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758



Foto: T137



Foto: Aconcagua



Erizo moruno: *Atelerix algirus*

Foto: Fundación Neotrópico

Más oscuro que el erizo moruno. Sus púas forman una V en la frente.
Ventre parduzco. Generalmente *Atelerix algirus* tiene morro oscuro y frente clara



NOMBRE COMÚN: **ZORRILLO O MOFETA LISTADA**
NOMBRE CIENTÍFICO: ***Mephitis mephitis*** (Schreber, 1776)





Foto: Tomfriedel



Foto: FakirNL



Conepatus semistriatus



Foto: Inao Vázquez

Bonete blanco que se bifurca en dos rayas dorsales.
Con línea blanca entre los ojos que está ausente en
el género *Conepatus*. Pelaje negro y blanco.



NOMBRE COMÚN: PETAURO O FALANGERO DEL AZUCAR
NOMBRE CIENTÍFICO: *Petaurus breviceps* Waterhouse, 1838



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fernando Barrera



Foto: Fundación Neotrópico

Ojos negros, grandes, entre los que hay una franja que se extiende hasta la base de la cola, que es peluda y gruesa. Pliegue de piel en los flancos desde la muñeca hasta los tobillos. Orejas grandes.



NOMBRE COMÚN: **SURICATO**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Suricata suricatta*** (Schreber, 1776)



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico

Orejas pequeñas, oscuras y redondas. Parche alrededor de los ojos.
Bandas dorsales. Cola larga con pelo corto y punta más oscura.
Nariz oscura. Zona ventral clara.



NOMBRE COMÚN: **CERDO VIETNAMITA**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Sus scrofa*** Linnaeus, 1758. Variedad doméstica, raza vietnamita



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico

Orejas pequeñas, rectas. Hocico corto. Patas cortas.
Pliegues en la cabeza de los adultos y a veces también
en el cuerpo. Con papada. Cola lisa, recta.



NOMBRE COMÚN: **FENNEC, FENECO O ZORRO DEL SÁHARA**

NOMBRE CIENTÍFICO: ***Vulpes zerda*** (Zimmermann, 1780)



II
B



Foto: Wildfeuer



Foto: Fundación Neotrópico



Foto: Fundación Neotrópico



Pelaje dorado, cola densa, morro corto y
orejas de grandes dimensiones.
Es el cánido de menor tamaño.